

# guía de las aves

del Parque Natural  
Sierra de Aracena  
y Picos de Aroche



Autores:

Humberto Gacio Iovino  Rafael Hernández Mancha

Ilustraciones: Antonio Díez Gallegos

# Índice

Prólogo .....	4
Presentación .....	5
Cómo usar esta guía .....	9
Identificación de especies.....	10
Tratamiento de las fichas descriptivas.....	11
Fuentes de información .....	12
Descripción del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche .....	13
Generalidades y localización .....	14
El medio físico.....	17
El medio biológico .....	18
Anseriformes .....	23
Galliformes .....	27
Podicipediformes.....	31
Pelecaniformes.....	35
Ciconiiformes .....	39
Falconiformes.....	49
Gruiformes .....	79
Charadriiformes .....	83
Columbiformes.....	97
Cuculiformes .....	103
Strigiformes .....	107
Caprimulgiformes .....	115
Apodiformes.....	119
Coraciiformes .....	125
Piciformes .....	131
Passeriformes .....	139
Aves accidentales .....	229
Agradecimientos.....	238
Bibliografía.....	239
Índice alfabético de aves: Nombres científicos .....	245
Índice alfabético de aves: Nombres comunes.....	247

# Perdiz roja

(*Alectoris rufa*) Perdigón, Pájaro perdiz

ESPAÑA DD  
ANDALUCÍA NA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Longitud: 32-35 cm.

 Envergadura: 46-63 cm.

 Peso: ♂525 ♀450 gr.

Orden:

Galliformes

Familia:

Phasianidae



**IDENTIFICACIÓN:** Destaca el colorido rojo intenso en su pico, en el anillo ocular y en sus patas. La garganta es totalmente blanca, seguida de una librea de plumas negras que empiezan en su pecho y ascienden para formar un característico antifaz. Tiene un moteado formado por colores marrones, negros, grises y blancos en ambos costados, debajo de sus alas. Su pechuga combina el color marrón rojizo claro con el gris y su dorso es de tono grisáceo desde la cabeza hasta la cola, en la que destaca dos bandas laterales rojizas. El macho es visiblemente más robusto que la hembra y está dotado de grandes espolones.

**ESTATUS:** Residente poco común aunque bien distribuida por todo el Parque. Es más escasa en promedio en la Sierra de Aracena.

**FENOLOGÍA:** Ave presente todo el año en nuestra Comarca.

**HÁBITAT:** En el Parque es un típico habitante de zonas cálidas de matorral con claros (jarales, brezales, montes mixtos, retamares, pastizales con matorral); está también presente en masas boscosas con sotobosque arbustivo, especialmente encinares, pinares y eucaliptales. En menor medida puebla olivares y encinares de suelos despejados. Resulta muy rara en castañares, salvo en los alrededores de Fuenteheridos, escapadas de granjas próximas.

**OBSERVACIONES:** A partir de julio-agosto se registran bandos –a veces numerosos– en las proximidades de zonas importantes de alimentación, los cuales están formados por adultos y jóvenes del año. Existe un Proyecto de Reintroducción en Santa Olalla.

# Codorniz común

(*Coturnix coturnix*) Codorniz

ESPAÑA DD  
ANDALUCÍA NA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Longitud: 16-18 cm.

 Envergadura: 32-35 cm.

 Peso: 70-120 gr.

Orden:

Galliformes

Familia:

Phasianidae



**IDENTIFICACIÓN:** De reducido tamaño, muy compacta y mimética y de aspecto similar a la perdiz común. Color general pardo con un conjunto de líneas longitudinales de color crema claro y pardo oscuro que recorren su dorso y cabeza, haciéndose más anchas en ésta. Se diferencia en los machos exclusivamente, un corbatín de color más o menos oscuro. Sus vuelos son cortos y rápidos, dejando de aletear bastante antes de posarse.

**ESTATUS:** Estival escaso, con débil paso de migrantes. Cría muy dispersa en unos pocos núcleos de poca entidad, estando ausente de la mayoría de la Comarca.

**FENOLOGÍA:** Se escuchan y ven codornices en el Parque entre marzo y octubre. No es descartable la permanencia de algunos ejemplares también en invierno.

**HÁBITAT:** Muy ligada a cultivo de herbáceas y pastizales de llanos y laderas, a veces combinados con matorral (retama, brezo) o arbolado (encinas, rebollos) y tanto en áreas bajas como de mayor altitud; supera los 1.000 msnm en la Tentudía onubense.

**OBSERVACIONES:** Al igual que otras aves ligadas a cultivos de secano, ha sufrido un importante declive en el Parque en la segunda mitad del siglo XX, motivado por el abandono de la agricultura del cereal. Actualmente es muy poco cazada en la Comarca, si bien antaño –cuando era más común– era una pieza muy apreciada y conocida por la población local.



PERDIZ ROJA



CODORNIZ COMÚN

# Buitre negro

(*Aegypius monachus*) Buitre, Butre



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



Longitud: 100-110 cm.



Envergadura: 250-295 cm.



Peso: 7000-11000 gr.

Orden:

Falconiformes

Familia:

Accipitridae



**IDENTIFICACIÓN:** Más grande todavía que el leonado, con alas de forma más rectangular y de mayor envergadura que las posiciona de forma plana cuando planea. Color negro uniforme en todo el cuerpo excepto en la parte superior de las alas que se vuelve más oscuro e intenso. Cuello alargado recubierto de plumas y dotado de un collarín pardo claro antes de llegar a la cabeza. La cabeza es de color pardo muy claro, cubierta de un plumón muy fino con colores oscuros en los ojos a modo de máscara. La base del pico es de color grisáceo azulado seguido de una parte oscura, robusta y terminada en forma de garfio. Tiene las patas gruesas, de color claro y dotadas de almohadillas ya que también se alimenta en el suelo. A diferencia del Buitre leonado cuando está posado se alza erguido, elegante y con cierta majestuosidad.

**ESTATUS:** Residente no reproductor y divagante escaso. Dejó de criar en el Parque hace unas décadas (última nidificación conocida en 1995), existiendo actualmente una población residente no reproductora compuesta por aves mayoritariamente jóvenes e inmaduras llegadas desde otras zonas, cifrada en algunas decenas de ejemplares –la mayoría de los cuales se mueve preferentemente por la zona occidental–. A ellas hay que sumar buitres que crían en colonias cercanas (Sierra Pelada y Sierra Norte de Sevilla) y que tienen parte de su área de alimentación en el Parque.

**FENOLOGÍA:** Se observa todo el año, sin que se aprecien importantes cambios estacionales en su número.

**HÁBITAT:** Campea sobrevolando zonas abiertas como dehesas, encinares, monte bajo y llanos ganaderos; por ello es posible verlo mientras surca los cielos de todo el Parque en busca de alimento, –normalmente integrado en grupos de buitres leonados–. Se alimenta principalmente de carroñas de pequeños y medianos mamíferos, y en el Parque es muy dependiente del ganado muerto. Especial mención merece la vinculación de los buitres de la zona occidental (Las Contiaditas) con las carroñas de ganado porcino, que hoy por hoy constituyen su principal sustento. Suele formar dormideros, ubicados principalmente en alcornoques, encinas y pinos, y también en algunos ríscales; normalmente son agrupaciones mixtas con buitre leonado.

**OBSERVACIONES:** El buitre negro mantuvo hasta hace unas décadas una pequeña colonia de cría en el occidente de la Sierra, que contaba con una media docena de parejas en los años 70. No es descartable la recolonización natural del Parque por la especie a medio plazo, y de hecho en 2004 ya crió una pareja aislada cerca de los límites del mismo. La colonia más próxima a nuestra Comarca es la ubicada en el Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserador y sus alrededores, la mayor de Andalucía y donde en los últimos años crían 75-80 parejas, constituyendo el Parque –sobre todo la zona occidental– una importante área de alimentación de dichas aves reproductoras. Dada la importancia de esta zona para la especie, el buitre negro es objeto de campañas de educación ambiental en la Sierra Occidental y de sensibilización y divulgación en algunas poblaciones del occidente del Parque, llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y por la asociación conservacionista Ándalus. Ésta última, además, lleva años desarrollando proyectos para intentar recuperar la antigua colonia de cría de la Sierra de Las Contiaditas.



BUITRE NEGRO

**PROBLEMÁTICA:** El resurgir de los venenos en Andalucía en los últimos años está provocando episodios periódicos de envenenamientos de buitres negros y otras aves carroñeras, con especial incidencia en la colonia de Sierra Pelada a la que tan ligados están muchos de los buitres que se ven en el Parque. Dentro de nuestro Espacio Natural no se tiene constancia de episodios de este tipo en los últimos tiempos, pero sí en sus proximidades y en otras zonas cercanas de Huelva y Sevilla. También es posible que la falta de comida pudiera llegar a incidir en la población de buitres negros del Parque, debido a la aplicación de las normas sanitarias que limitan el vertido de cadáveres de ganado al campo; este problema se podría prevenir con la instalación de muladares regulados en la Sierra.

# Rapaces en vuelo



Abejero europeo



juvenil



Elanio común

adulto



Buitre leonado



Buitre negro



Culebrera europea



Azor común



Gavilán común



juvenil



adulto

Águila real



Águila pescadora



Cernícalo primilla



juvenil

Alcotán europeo



adulto

# Rapaces en vuelo



Milano negro



Milano real



juvenil



adulto

Alimoche común



♀

Aguilucho lagunero occidental



♂



♂



♀

Aguilucho cenizo



fase clara

Busardo ratonero



fase oscura



juvenil



adulto

Águila imperial ibérica



fase clara

Aguililla calzada



fase oscura



juvenil

Águila-azor perdicera




adulto



♂

Cemicalo vulgar



♀



♀

Esmerejón



♂



juvenil

Halcón peregrino



adulto





piciformes

# Ruiseñor común

(*Luscinia megarhynchos*) Ruiseñor

ESPAÑA NA  
ANDALUCÍA NA

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

 Longitud: 16,5 cm.

 Envergadura: 23-26 cm.

 Peso: 18-26 gr.

Orden:

Passeriformes

Familia:

Turdidae



**IDENTIFICACIÓN:** Famoso por su aflautado y potente canto con un sin fin de espectaculares y variadas melodías que emite camuflado entre la maleza. Partes superiores marrón-parduzco liso, obispillo y cola rojizas. Cara de tono claro con la mejilla oscura, ojos grandes, negro azabache y con anillo claro rodeando a estos. Partes inferiores gris limpio con zona cloacal más clara. Pico fino, oscuro y con boquera amarillenta.

**ESTATUS:** Estival y migrante común, bien distribuido por todo el Parque.

**FENOLOGÍA:** Se observa en la Comarca desde mediados de marzo hasta finales de septiembre e incluso en octubre. El paso prenupcial es más patente, ya que en el postnupcial los reproductores suelen marcharse progresivamente tras finalizar la cría.

**HÁBITAT:** Se trata de una especie que selecciona zonas frescas dentro de áreas de clima mediterráneo. Ocupa riberas, tanto de arbolado como de matorral, pero en otro tipo de bosques sólo se le halla si cuentan con sotobosque o parches frescos de matorral. También aparece en vaguadas, laderas arbustivas de umbría, bardales, linderos, etc. Incluso cría dentro de pueblos que conservan algo de arbusto y arbolado fresco (por ejemplo, chopos en huertos o junto a albercas en corrales).

**OBSERVACIONES:** Su canto –que también emite de noche durante la época de celo– es muy típico y conocido por la población serrana.

# Colirrojo tizón

(*Phoenicurus ochruros*)

ESPAÑA NA  
ANDALUCÍA NA

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

 Longitud: 14,5 cm.

 Envergadura: 23-26 cm.

 Peso: 14-20 gr.

Orden:

Passeriformes

Familia:

Turdidae



**IDENTIFICACIÓN:** Suele hacer desplazamientos rápidos y cuando está posado se agacha bruscamente, vibrando su cola como si tuviera un muelle en la base de ésta. Macho variablemente oscuro con tonalidades claras en las secundarias, pileo gris, obispillo y cola rojo óxido con franja central oscura. Pecho, garganta y vientre negros con zona cloacal blanco rojiza. La hembra cambia los tonos negros del macho por grises siendo más oscuros en sus alas.

**ESTATUS:** Invernante y migrante poco común. Aunque sus números no son elevados, se encuentra muy bien distribuido por todo el Parque tanto en invernada como durante los dos pasos migratorios.

**FENOLOGÍA:** Los primeros aparecen normalmente a mediados de octubre y los últimos se marchan a finales de marzo. No obstante, a veces se registran aves en septiembre y en abril.

**HÁBITAT:** Evita los bosques más cerrados. Está presente en gran variedad de hábitats, siendo los principales los llanos ganaderos, campos arados, prados y dehesas. También se ve en pueblos, canteras, crestas y cortados rocosos, valles de ríos y arroyos, zonas de matorral con claros, etc. Ocasionalmente pueden verse individuos pasar las frías noches de invierno al calor de las farolas antiguas de los pueblos.

**OBSERVACIONES:** Aunque hasta la fecha las prospecciones realizadas en búsqueda de colirrojos reproductores han sido negativas, no es totalmente descartable que esta especie pueda criar en muy pequeño número en alguna zona del Parque (especialmente en algún pueblo o riscal de difícil acceso).



RUIÑEÑOR COMÚN



COLIRROJO TIZÓN